

# Impfkalender

Alter	Schutzimpfung	Hinweis
ab 6 Wochen	Rotaviren	zwei bzw. drei Mal im Abstand von vier Wochen
ab Beginn des 2. Monats	Diphtherie, Pertussis (Keuchhusten), Tetanus (Wundstarrkrampf), Polomyelitis (Kinderlähmung), Haemophilus influenzae Typ B, Hepatitis B (Gelbsucht), Pneumokokken	drei Mal im Abstand von vier Wochen; Kombinationsimpfstoffe verfügbar
11. – 14. Monat	Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Polomyelitis, Haemophilus influenzae Typ B, Hepatitis B, Pneumokokken Masern, Mumps, Röteln Varizellen (Windpocken)	vierte Impfung erste Impfung (MMR-Kombinationsimpfstoff) erste Immunisierung getrennt von der MMR-Impfung
ab 12. Monat	Meningokokken Typ C	nur eine Impfung
15. – 23. Monat	Masern, Mumps, Röteln, Varizellen	zweite Impfung (MMRV-Kombinationsimpfstoff). Die zweite Varizellen-Impfung kann gleichzeitig mit der MMR-Impfung erfolgen.
5 – 6 Jahre	Tetanus, Diphtherie, Pertussis	Auffrischimpfung
9 – 17 Jahre	Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis Hepatitis B Varizellen	Auffrischimpfung Grundimmunisierung nicht geimpfter Jugendlicher, Komplettierung des Impfschutzes nicht geimpfte und bisher nicht erkrankte Jugendliche
12 – 17 Jahre	Gebärmutterhalskrebs (HPV)	drei Impfungen in der Regel innerhalb von sechs Monaten
18 – 60 Jahre	Diphtherie, Tetanus Pertussis	jeweils zehn Jahre nach der letzten Impfung einmalig, Kombination mit Diphtherie und Tetanus
ab 60 Jahren	Influenza Pneumokokken	jährlich einmalig