

(I CAN'T GET NO?) SATISFACTION



Trotz Erkältung voll im Leben

Wer beruflich und privat voll im Leben steht, kann und möchte es sich meist nicht leisten auszufallen – ganz besonders nicht zu Gelegenheiten, die im Leben einzigartig sind. Schließlich möchte niemand mit laufender Nase und Fieber zuhause sitzen, während das Konzert der Lieblingsband, die Hochzeit der besten Freundin oder die Taufe der Nichte ohne ihn stattfindet. In diesen Fällen bietet das Kombipräparat Aspirin® Complex eine Lösung: Es befreit bei Erkältung von Kopf-, Hals-, Gliederschmerzen sowie Fieber und löst gleichzeitig die Verstopfung in der Nase und den Nebenhöhlen. Dabei wirkt es schnell, zuverlässig und entzündungshemmend. So bekommen Sie die unangenehmen Erkältungsbeschwerden schnell in den Griff, und den ganz besonderen Augenblicken im Leben steht nichts mehr im Weg!



ASPIRIN® COMPLEX, ASPIRIN® COMPLEX HEISSGETRÄNK. Wirkstoffe: Acetylsalicylsäure und Pseudoephedrinhydrochlorid. **Zusammensetzung:** 1 Beutel ASPIRIN® COMPLEX enthält: Wirkstoffe: Acetylsalicylsäure 500 mg, Pseudoephedrinhydrochlorid 30 mg; sonstige Bestandteile: wasserfreie Citronensäure, Sucrose, Hypromellose, Saccharin, Orangenaroma mit Benzylalkohol, Alpha-Tocopherol, modifizierte Stärke und Maltodextrin; 1 Beutel ASPIRIN® COMPLEX HEISSGETRÄNK enthält: Wirkstoffe: Acetylsalicylsäure 500 mg, Pseudoephedrinhydrochlorid 30 mg; sonstige Bestandteile: Sucrose, Hypromellose, Sucralose, Vanille-Aroma, Novamin Menthollyptus-Aroma (enthält Menthol und Cineol). **Anwendungsgebiete:** ASPIRIN® COMPLEX; ASPIRIN® COMPLEX HEISSGETRÄNK: Zur symptomatischen Behandlung von Schleimhautschwellung der Nase und Nebenhöhlen bei Schnupfen (Rhinosinusitis) mit Schmerzen und Fieber im Rahmen einer Erkältung bzw. eines grippalen Infektes. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Pseudoephedrin, Acetylsalicylsäure, anderen Salicylaten oder einen der anderen Bestandteile des Arzneimittels, Menthol und Cineol in ASPIRIN® COMPLEX HEISSGETRÄNK, Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüre, krankhaft erhöhte Blutungsneigung, Schwangerschaft, Stillzeit, Leber- und Nierenversagen, schwere, nicht eingestellte Herzschwäche (Herzinsuffizienz), Kombination mit Methotrexat in einer Dosierung von 15 mg/Woche oder mehr, schwerer Bluthochdruck oder schwere koronare Herzkrankheit, gleichzeitige Einnahme von Monoaminooxidasehemmern. **Nebenwirkungen:** Die möglichen Nebenwirkungen von Acetylsalicylsäure sind: Magengeschwüre, die in Einzelfällen zum Magendurchbruch führen können, Magen-Darm-Blutungen, die in Einzelfällen zu einer Eisenmangelanämie führen können, Zeichen hierfür sind schwarze Stühle oder blutiges Erbrechen, allergische Reaktionen (wie Atemnot, Hautreaktionen möglicherweise mit Blutdruckabfall) insbesondere bei Asthmatikern. Erhöhung des Blutungsrisikos, Magen-Darm-Beschwerden wie Magenschmerzen, Verdauungsbeschwerden, Magenschleimhautentzündung, Erhöhung der Leberenzymwerte, Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle. Schwindel und Tinnitus können Symptome für eine Überdosierung sein. Die möglichen Nebenwirkungen von Pseudoephedrin sind: Wirkungen am Herzen (z. B. Herzrasen), Harnverhalt, insbesondere bei Patienten mit Prostatavergrößerung, Blutdruckanstieg, jedoch nicht bei behandeltem Bluthochdruck, Schlaflosigkeit, selten Halluzinationen oder andere Stimulierungen des zentralen Nervensystems, Wirkungen auf die Haut (z. B. Ausschlag, Nesselfieber, Juckreiz). Bei entsprechend empfindlichen Personen können durch Menthol und Cineol Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) ausgelöst werden. **Hinweise:** Nehmen Sie dieses Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Tage ein. Enthält 2 g Sucrose (Saccharose) pro Beutel. Bitte Packungsbeilage beachten! Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen, Deutschland, 04/2015